

本说明书内容只是将向日本国内顾客提供的信息翻译成中文而已，这些信息仅供参考，详细信息请参照产品的说明书

2013年6月修订

使用前请一定要阅读说明书并请妥善保管说明书以便必要时能够阅读

第2类医药品

葛根汤浸膏颗粒「至圣」

葛根汤浸膏颗粒「至圣」是具有代表性的汉方药「葛根汤」的易于服用的颗粒剂。它适用于感冒初起，头痛，鼻炎，恶寒等症状，并服用后不引起困倦等症状。此外还能缓解肩膀僵硬和肌肉痛，使用电脑等后会出现的手・肩膀疼痛等症状。

注意事项

《请咨询》

1. 符合下列情况时，在使用之前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

- (1) 正在接受医师治疗的人
- (2) 孕妇或可能怀孕的人
- (3) 身体虚弱的人（体衰，体弱）
- (4) 肠胃虚弱的人
- (5) 有显著的出汗倾向的人
- (6) 老年人
- (7) 曾经使用药物等后出现皮疹・发红或发痒等症状的人
- (8) 有下列症状的人
 浮肿，排尿困难
- (9) 被诊断为下列疾病的人
 高血压，心脏病，肾脏病，甲状腺功能障碍

2. 使用后若出现下列症状时，有副作用的可能性。应立即停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

部位	症状
皮肤	皮疹・发红，发痒
消化系统	恶心，食欲不振，胃部不适

偶尔会出现下列严重症状，应立即接受医师诊疗。

症状名称	症状
假性醛固酮增多症，肌病	出现四肢酸软，发麻，僵直，僵硬感之外，

	还出现并渐渐加强无力感，肌肉疼痛
肝功能障碍	出现发热，发痒，皮疹，黄疸（皮肤和白眼珠发黄），褐色尿，全身酸软，食欲不振等

3. 用药约 1 个月（用于感冒初期，鼻炎，头痛时用药 5~6 次）症状未有缓解时，停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

4. 长期连续服用时，应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

[功能·主治]

用于体力中等度以上的下列诸症：

感冒初期（未见出汗），急性鼻炎，鼻炎，头痛，肩膀僵硬，肌肉痛，手·肩膀疼痛

[用法·用量]

餐前或餐间，用水或开水送服下列用量。或加开水搅拌使颗粒溶解，趁热服用。

年龄	1 次量	1 日服用次数
成人（15 岁以上）	1 袋	3 次
7 岁以上 未满 15 岁	2/3 袋	
4 岁以上 未满 7 岁	1/2 袋	
未满 4 岁	请不要服用	

餐间服：即在两餐之间，上次饭后 2-3 小时后服用。

[关于用法·用量的注意]

1. 给 4 岁以上的儿童使用时，必须在家长的监护下使用。
2. 应遵守用法·用量
3. 使颗粒溶解服用时，加开水并用匙子等搅拌使颗粒溶解后趁早服用。服用后有未溶解颗粒残渣时在加开水搅拌使溶解，全都喝掉。

[成分·分量]

1 日量 3 袋（1 袋装 3.0g）中

葛根汤浸膏 5.0g

由葛根 8g，麻黄 4g，生姜 1g，大枣 4g，桂皮 3g，芍药 3g，甘草 2g 而制的干燥浸膏
辅料：含有白糖，乳糖，D-甘露糖，蔗糖脂肪酸酯

[保管和使用上注意]

1. 请储藏在避免直接日晒的阴凉干燥处。
2. 请储藏在儿童不能接触的地方。
3. 请不要放其他容器内（以免误用，防止变质）

4. 将 1 袋分割使用后的剩余，请将袋口 2 次折叠后保管，并在 2 日内使用。

生产销售商 北日本制药株式会社
富山县中新川郡上市町若杉 55