

本说明书内容只是将向日本国内顾客提供的信息翻译成中文而已，这些信息仅供参考，详细信息请参照产品的说明书

2013年6月修订

使用前请一定要阅读说明书并请妥善保管说明书以便必要时能够阅读

第2类医药品

小青龙汤浸膏颗粒「创至圣」

注意事项

《禁止事项》

如不遵守则恶化现有症状，也容易出现副作用

1. 符合下列情况时，请不要服用

未满3个月的乳儿

《请咨询》

1. 符合下列情况时，在使用之前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

- (1) 正在接受医师治疗的人
- (2) 孕妇或可能怀孕的人
- (3) 身体虚弱的人（体衰，体弱）
- (4) 肠胃虚弱的人
- (5) 有显著的出汗倾向的人
- (6) 老年人
- (7) 曾经使用药物等后出现皮疹・发红或发痒等症状的人
- (8) 有下列症状的人
 浮肿，排尿困难
- (9) 被诊断为下列疾病的人
 高血压，心脏病，肾脏病，甲状腺功能障碍

2. 使用后若出现下列症状时，有副作用的可能性。应立即停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

部位	症状
皮肤	皮疹・发红，发痒
消化系统	恶心，食欲不振，胃部不适

偶尔会出现下列严重症状，应立即接受医师诊疗。

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯等身体不保重稍微勉强后出现气急，喘不过气来，干咳，发热等，这些症状会突然出现，也会持续。
假性醛固酮增多症，肌病	出现四肢酸软，发麻，僵直，僵硬感之外，还出现并渐渐加强无力感，肌肉疼痛
肝功能障碍	出现发热，发痒，皮疹，黄疸（皮肤和白眼珠发黄），褐色尿，全身酸软，食欲不振等

3. 用药约 1 个月（用于感冒时用药 5~6 日）症状未有缓解时，停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

4. 长期连续服用时，应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

[成分·分量]

1 日量 3 袋（每袋装 2.5g）中

小青龙汤浸膏 6g

由麻黄 3g，桂皮 3g，芍药 3g，细辛 3g，生姜 3g，五味子 3g，甘草 3g，半夏 6g 而制的干燥浸膏

添加物：含有乳糖，蔗糖脂肪酸酯

[功能·主治]

用于体力中等度或稍微虚弱，有伴有稀薄痰的咳嗽和流涕的下列诸症：

支气管炎，支气管哮喘，鼻炎，过敏性鼻炎，浮肿，感冒，花粉症

[用法·用量]

餐前或餐间，用水或开水送服下列用量。

年龄	1 次量	1 日服用次数
成人（15 岁以上）	1 袋	3 次
7 岁以上 未满 15 岁	2/3 袋	
4 岁以上 未满 7 岁	1/2 袋	
2 岁以上 未满 4 岁	1/3 袋	
未满 2 岁	1/4 袋	

餐间服：即在两餐之间，上次饭后 2-3 小时后服用。

[关于用法·用量的注意]

1. 给 2 岁以上的儿童使用时，必须在家长的监护下使用。

2. 未满 1 岁的乳儿应当优先接受医师诊疗，而在不得已的情况下才给乳儿使用。

[保管和使用上注意]

1. 请储藏在避免直接日晒的阴凉干燥处。
2. 请储藏在儿童不能接触的地方。
3. 请不要放其他容器内（以免误用，防止变质）
4. 将 1 袋分割使用后的剩余，请将袋口 2 次折叠后保管，并在 2 日内使用。
5. 请不要使用超过使用期限的产品。

生产销售商 北日本制药株式会社
富山县中新川郡上市町若杉 55