

本说明书内容只是将向日本国内顾客提供的信息翻译成中文而已，这些信息仅供参考，详细信息请参照产品的说明书

使用前请一定要阅读说明书并请妥善保管说明书以便必要时能够阅读

第2类医药品

柴胡桂枝汤浸膏颗粒 KM

适用于感冒中期到后期，肠胃炎

柴胡桂枝汤浸膏颗粒 KM 是中国自古以来传下来的汉方药「柴胡桂枝汤」的易于服用的颗粒剂。它能改善伴有微热，恶心，腹痛，恶心等症状的感冒中期到后期和肠胃炎。

注意事项

《禁止事项》

如不遵守则恶化现有症状，也容易出现副作用

1. 符合下列情况时，请不要服用

未满3个月的乳儿

《请咨询》

1. 符合下列情况时，在使用之前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

(1) 正在接受医师治疗的人

(2) 孕妇或可能怀孕的人

(3) 老年人

(4) 曾经使用药物后出现皮疹·发红或发痒等症状的人

(5) 有下列症状的人

浮肿

(6) 被诊断为下列疾病的人

高血压，心脏病，肾脏病

2. 使用后若出现下列症状时，有副作用的可能性。应立即停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

部位	症状
皮肤	皮疹·发红，发痒
其他	尿频，排尿痛，血尿，残尿感

偶尔会出现下列严重症状，应立即接受医师诊疗。

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯等身体不保重稍微勉强后出现气急，

	喘不过气来，干咳，发热等，这些症状会突然出现，也会持续。
假性醛固酮增多症，肌病	出现四肢酸软，发麻，僵直，僵硬感之外，还出现并渐渐加强无力感，肌肉疼痛
肝功能障碍	出现发热，发痒，皮疹，黄疸（皮肤和白眼珠发黄），褐色尿，全身酸软，食欲不振等

3 用药约 1 个月（用于感冒中期到后期时用药约 1 周）症状未有缓解时，停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

4. 长期连续服用时，应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

[功能・主治]

用于体力中等度或稍微虚弱，多伴有腹痛，时有微热，恶寒，头痛，恶心等的下列诸症：
肠胃炎，感冒中期到后期的症状

[用法・用量]

一日 3 次，餐前或餐间，用水或温水送服下列一次用量。

年龄	成人(15 岁以上)	7 岁以上 未 满 15 岁	4 岁以上 未 满 7 岁	2 岁以上 未 满 4 岁	未满 2 岁
1 次量	1 袋	2/3 袋	1/2 袋	1/3 袋	1/4 袋

餐间服：即在两餐之间，上次饭后 2-3 小时后服用。

[关于用法・用量的注意]

1. 应遵守用法・用量
2. 给儿童使用时，必须在家长的监护下使用。
3. 未满 1 岁的乳儿应当优先接受医师诊疗，而在不得已的情况下才给乳儿使用。

[成分・分量]

3 袋（成人（15 岁以上）1 日量：7.5g）中

柴胡桂枝汤浸膏 4.00g

由柴胡 5.0g，半夏 4.0g，桂皮 2.5g，黄芩 2.0g，芍药 2.0g，大枣 2.0g，人参 2.0g，甘草 1.5g，生姜 1.0g 而制的干燥浸膏

辅料：含有乳糖，硬脂酸镁

本药是由天然中药材提取而制的制剂，所以颗粒剂的颜色，风味可能因产品而稍微不同。但不会影响其药效。

[保管和使用上注意]

1. 请储藏在避免直接日晒的阴凉干燥处。
2. 请储藏在儿童不能接触的地方。
3. 请不要放其他容器内（以免误用，防止变质）
4. 将 1 袋分割使用后的剩余，请将袋口 2 次折叠后保管，并在 2 日内使用。
5. 请不要使用超过使用期限的产品。

销售商 北日本制药株式会社
富山县中新川郡上市町若杉 55

生产销售商 株式会社 Kahya
大阪府吹田市垂水町 3-4-11