

本说明书内容只是将向日本国内顾客提供的信息翻译成中文而已，这些信息仅供参考，详细信息请参照产品的说明书

2013年8月修订

使用前请一定要阅读说明书并请妥善保管说明书以便必要时能够阅读

第2类医药品

防风通圣散料浸膏片「东亚」

防风通圣散料浸膏片「东亚」是中国自古以来传下来的汉方药「防风通圣散」的易于服用的片剂。适用于由现代人享受的美食，饱食和运动不足等原因导致的腹部有皮下脂肪堆积的人群。本药所含的18种中药互相合作，起着发汗，利尿和通便等作用能对伴有上火的肩膀僵硬，浮肿或便秘等症状有效果。

注意事项

《禁止事项》

如不遵守则恶化现有症状，也容易出现副作用

1. 服用本药期间，请不要服用下列药品

其他泻药

2. 哺乳期请不要服用本药，或服用本药时请不要哺乳。

《请咨询》

1. 符合下列情况时，在使用之前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

- (1) 正在接受医师治疗的人
- (2) 孕妇或可能怀孕的人
- (3) 身体虚弱的人（体衰，体弱）
- (4) 肠胃虚弱的人，容易腹泻的人
- (5) 有显著的出汗倾向的人
- (6) 老年人
- (7) 曾经使用药物等后出现皮疹・发红或发痒等症状的人
- (8) 有下列症状的人
浮肿，排尿困难
- (9) 被诊断为下列疾病的人
高血压，心脏病，肾脏病，甲状腺功能障碍

2. 使用后若出现下列症状时，有副作用的可能性。应立即停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

部位	症状
皮肤	皮疹·发红，发痒
消化系统	恶心·呕吐，食欲不振，胃部不适，腹部膨胀，伴有剧烈腹痛的腹泻，腹痛
精神神经系统	眩晕
其他	出汗，心悸，浮肿，头痛

偶尔会出现下列严重症状，应立即接受医师诊疗。

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯等身体不保重稍微勉强后出现气急，喘不过气来，干咳，发热等，这些症状会突然出现，也会持续下去。
假性醛固酮增多症，肌病	出现四肢酸软，发麻，僵直，僵硬感之外，还出现并渐渐加强无力感，肌肉疼痛
肝功能障碍	出现发热，发痒，皮疹，黄疸（皮肤和白眼珠发黄），褐色尿，全身酸软，食欲不振等

3. 服用后会出现下列症状，若该症状持续或加强时，应停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

泄泻，便秘

4. 用药约 1 个月（用于便秘时用药约 1 周）症状未有缓解时，停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

5. 长期连续服用时，应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

[功能·主治]

用于体力充实，腹部有多余皮下脂肪，有便秘倾向的下列诸症：

高血压，肥胖伴有的心悸·肩膀僵硬·上火·浮肿·便秘·慢性鼻窦炎（鼻窦炎）·湿疹·皮肤炎，疖子（粉刺），肥胖症

[用法·用量]

餐前或餐间，用白开水或水送服下列用量

年龄	1 次量	1 日服用次数
成人（15 岁以上）	4 片	3 次
未满 15 岁	请不要服用	

餐间服：即在两餐之间，上次饭后 2-3 小时后服用。

[成分·分量]

1 日量 12 片（片重 450mg）中

防风通圣散料干燥浸膏 3.0g

由当归 0.60g, 芍药 0.60g, 川芎 0.60g, 山栀子 0.60g, 连翘 0.60g, 薄荷 0.60g, 生姜 0.20g, 荆芥 0.60g, 防风 0.60g, 麻黄 0.60g, 大黄 0.75g, 芒硝 0.75g, 白术 1.00g, 桔梗 1.00g, 黄芩 1.00g, 甘草 1.00g, 石膏 1.00g, 滑石 1.50g 而制的干燥浸膏

辅料: 含有乳糖, 纤维素, CMC-Ca (羧甲基纤维素钙), 硬脂酸镁, Talc (滑石)

[保管和使用上注意]

1. 请在避免直接日晒的阴凉干燥处, 密封储藏。
2. 请储藏在儿童不能接触的地方。
3. 请不要放其他容器内 (以免误用, 防止变质)
4. 因为本药易受潮, 每次用完后请盖好盖子。

[防风通圣散料浸膏片「东亚」适用于下列情况]

所谓的胖得敦实的人, 有便秘倾向的肥胖症, 浮肿, 便秘	有肥胖, 便秘倾向的高血压伴有的心悸, 肩膀僵硬和上火
------------------------------	-----------------------------

生产销售商 北日本制药株式会社
富山县中新川郡上市町若杉 55