

本说明书内容只是将向日本国内顾客提供的信息翻译成中文而已，这些信息仅供参考，详细信息请参照产品的说明书

2013年6月修订

使用前请一定要阅读说明书并请妥善保管说明书以便必要时能够阅读

第2类医药品

防己黄芪汤浸膏片「东亚」

本药是由「防己黄芪汤」提取的浸膏而制的易于服用的片剂。适用于皮肤白，肌肉松弛，易疲倦，有易出汗倾向的肥胖症，关节肿痛等症状。

注意事项

《请咨询》

- 符合下列情况时，在使用之前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。
 - 正在接受医师治疗的人
 - 孕妇或可能怀孕的人
 - 曾经使用药物等后出现皮疹·发红或发痒等症状的人
- 使用后若出现下列症状时，有副作用的可能性。应立即停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

部位	症状
皮肤	皮疹·发红，发痒
消化系统	食欲不振，胃部不适

偶尔会出现下列严重症状，应立即接受医师诊疗。

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯等身体不保重稍微勉强后出现气急，喘不过气来，干咳，发热等，这些症状会突然出现，也会持续下去。
肝功能障碍	出现发热，发痒，皮疹，黄疸（皮肤和白眼珠发黄），褐色尿，全身酸软，食欲不振等

- 用药约1个月症状未有缓解时，停药并携带说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

[功能·主治]

用于体力中等度以下，易疲倦并易出汗倾向的下列诸症：

肥胖伴有的关节肿痛，浮肿，多汗症，肥胖症（肌肉松弛的所谓的虚胖）

[用法・用量]

餐前或餐间，用水或白开水送服下列用量

年龄	1 次量	1 日服用次数
成人（15 岁以上）	4 片	3 次
7 岁以上 未满 15 岁	3 片	
5 岁以上 未满 7 岁	2 片	
未满 5 岁	请不要服用	

餐间服：即在两餐之间，上次饭后 2-3 小时后服用。

[关于用法・用量的注意]

给 5 岁以上的儿童使用时，必须在家长的监护下使用。

[成分・分量]

1 日量 12 片（片重 320mg）中

防己黄芪汤浸膏 1.90g

由防己 2.50g，黄芪 2.50g，白术 1.50g，大枣 1.50g，甘草 0.75g，生姜 0.50g 而制的干燥浸膏

辅料：含有乳糖，纤维素，CMC-Ca（羧甲基纤维素钙），硬脂酸镁

[保管和使用上注意]

1. 请在避免直接日晒的阴凉干燥处，密封储藏。
2. 请储藏在儿童不能接触的地方。
3. 请不要放其他容器内（以免误用，防止变质）
4. 本药是用天然中药材（草根木皮）而制的制剂，所以片剂的颜色可能因产品而稍微不同。但不会影响其药效。
5. 请不要使用超过使用期限的产品。

生产销售商 北日本制药株式会社
富山县中新川郡上市町若杉 55