

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

柴胡桂枝湯エキス顆粒KM

漢方製剤 ぜかぜの中期～後期，胃腸炎にぜ 満量処方

柴胡桂枝湯エキス顆粒KMは、古くから中国に伝わる漢方処方「柴胡桂枝湯」を飲みやすくしたエキス顆粒剤です。微熱や寒気，腹痛や吐き気などのかぜの中期から後期，胃腸炎にみられる症状によく効きます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤，かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧，心臓病，腎臓病

2. 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤，かゆみ
その他	頻尿，排尿痛，血尿，残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり，少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる，空せき，発熱等がみられ，これらが急にあらわれたり，持続したりする。
偽アルドステロン症， ミオパチー	手足のだるさ，しびれ，つっぱり感やこわばりに加えて，脱力感，筋肉痛があらわれ，徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱，かゆみ，発疹，黄疸（皮膚や白目が黄色くなる），褐色尿，全身のだるさ，食欲不振等があらわれる。

裏面の効能・効果，用法・用量，保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください。

3. 1ヵ月位（かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

【用法・用量】

次の1回量を1日3回食前又は食間に、水又はぬるま湯で服用する。

年 齢	成人（15才以上）	7才以上 15才未満	4才以上 7才未満	2才以上 4才未満	2才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

＜用法・用量に関連する注意＞

1. 用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させること。

【成分・分量】

3包（成人1日量：7.5g）中

柴胡桂枝湯エキス…………… 4.00g

サイコ…………… 5.0g	ハンゲ…………… 4.0g	ケイヒ…………… 2.5g
オウゴン…………… 2.0g	シャクヤク…………… 2.0g	タイソウ…………… 2.0g
ニンジン…………… 2.0g	カンゾウ…………… 1.5g	ショウキョウ… 1.0g

より製した乾燥エキス）

添加物：乳糖，ステアリン酸Mgを含有

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。
 北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55
 電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30（土、日、祝日を除く）

発売元
北日本製薬株式会社
 富山県中新川郡上市町若杉55

製造販売元
株式会社カーヤ
 大阪府吹田市垂水町3-4-11