

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

きょうせい は てきが んりょう

響声破笛丸料エキス顆粒KM

漢方製剤 ～しわがれ声・のどの不快感～ 満量処方

響声破笛丸料エキス顆粒KMは、古くから中国に伝わる漢方処方「響声破笛丸」を飲みやすくしたエキス顆粒剤です。普段からのどが弱かったり、声の出しすぎや歌いすぎなどでのどの調子が悪く、しわがれ声やのどに不快感があるときによく効きます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

- 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

裏面の効能・効果、用法・用量、保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

しわがれ声、咽喉不快

<効能・効果に関連する注意>

○体力に関わらず、使用できる。

【用法・用量】

次の1回量を1日3回食前又は食間に、水又はぬるま湯で服用する。

年 齢	成人（15才以上）	7才以上 15才未満	4才以上 7才未満	2才以上 4才未満	2才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

<用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

【成分・分量】

3包（成人1日量：7.5g）中

響声破笛丸料水製乾燥エキス…………… 3.50g

ハッカ…………… 4.0 g	レンギョウ…………… 2.5 g	キキョウ…………… 2.5 g
カンゾウ…………… 2.5 g	アセンヤク…………… 2.0 g	ダイオウ…………… 1.0 g
シュクシャ…………… 1.0 g	センキュウ…………… 1.0 g	カシ…………… 1.0 g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖，白糖，ステアリン酸Mg，ケイヒ油，ℓ-メントールを含有

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。
北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55
電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30(土、日、祝日を除く)

製造販売元

北日本製薬株式会社
富山県中新川郡上市町若杉55