

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

さい こ けい し とう

柴胡桂枝湯エキス顆粒KM

漢方製剤 〓かぜの中期～後期、胃腸炎に〓 満量処方

柴胡桂枝湯エキス顆粒KMは、古くから中国に伝わる漢方処方「柴胡桂枝湯」を飲みやすくしたエキス顆粒剤です。微熱や寒気、腹痛や吐き気などのかぜの中期から後期、胃腸炎にみられる症状によく効きます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

裏面の効能・効果、用法・用量、保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください。

3. 1ヵ月位（かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

【用法・用量】

次の1回量を1日3回食前又は食間に、水又はぬるま湯で服用する。

年 齢	成人（15才以上）	7才以上 15才未満	4才以上 7才未満	2才以上 4才未満	2才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

<用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

【成分・分量】

3包（成人1日量：7.5g）中

柴胡桂枝湯エキス	4.00 g				
サイコ	5.0 g	ハンゲ	4.0 g	ケイヒ	2.5 g
オウゴン	2.0 g	シャクヤク	2.0 g	タイソウ	2.0 g
ニンジン	2.0 g	カンゾウ	1.5 g	ショウキョウ	1.0 g
より製した乾燥エキス					

添加物：乳糖，ステアリン酸Mgを含有

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。
北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55
電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30(土、日、祝日を除く)

製造販売元

北日本製薬株式会社
富山県中新川郡上市町若杉55